

第127回 日本小児科学会報告



2024.4月 福岡

子宮頸がんワクチン：接種差し控え終了後、接種率は高まってきたが、まだ他の先進国と比べると半分以下。痛み・失神など副反応と疑われた症状は、ワクチンと関係ないことがわかってきましたが、まだ周知されていません。

不登校：中学生では、1人/16人。増えている。運動不足、デコンディショニング（身体を動かさないことによっておこる異変の総称）を防ぐ、社会参加を促すこともいい。登校することが目標ではない。高校に入学し、状況が変わると改善することがある。（友が変わるので）。

吃音（どもり）：（おこさまの名前）ちゃんタイムをつくる。（二人だけのお話やお遊びの時間）1回10分でも。1～3回/週。終了時、次の約束をする。会話ではお子さんの語尾をゆっくり繰り返す。自分の話や、助言はしない。

夜尿：便秘・ADHD・睡眠時無呼吸と関係ありそう。ミニリンメルトは1錠で効きが悪ければ、速やかに2錠に増量を。

新しいRSウイルス感染の予防薬の登場：バイフォータス。シナジスよりも回数が少なくてすむ。すべての乳児が対象だが、現時点では自費。

乳児（萐状）血管腫：ヘマンジオール（内服のシロップ）が有効。低血糖・低血圧などの副反応は少ないことがわかってきました。

乳児の難治性下痢：離乳食は、長期間中断しない。
乳児消化管アレルギーの原因：乳は横ばいだが、卵黄が増えてきた。

高級水性樹脂（高級水溶性ポリマー）：乳児が飲み込んで、十二指腸閉塞させた事故あり、要注意

神経線維種症Ⅰ型の治療薬が開発されました。



平井こどもクリニック